


TIAMULINA-20

ANTIBIÓTICO PREMIX

TIAMULINA-20 está indicado para el tratamiento y metaflaxis de la enfermedades respiratorias crónicas; sinusitis infecciosas, aerosaculitis causadas por cepas de mycoplasma gallisepticum, mycoplasma simoviae y mycoplasma meleagridis; pasteurella multocida, pasteurella gallinarum, staphylococcus Aureus, campylobacter coli.

Porcinos: Infecciones gastrointestinales (E.coli) desenteria hemorrágica, neumonía enzoótica causadas por mycoplasmas, pasteurellas y actinobacillus.



COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Tiamulina fumarato hidrogenada 25 g
(equivale a tiamulina a base 20 g)

Excipientes C.S.P. 100 g



DOSIFICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Uso Oral



Aves: Dosificar 20 mg de TIAMULINA base/kg P.V. día equivale (1 g de producto / 10 kg P.V./día) durante 5 a 8 días consecutivos en el alimento. Dosis por tonelada de alimento 2kg.



Porcinos: Dosificar 5 mg a 10 mg de TIAMULINA base/kg P.V. día equivale a (0.5 - 1 g de producto por 20 kg/kg P.V./día) durante 7 a 14 días consecutivos en el alimento dependiendo de la severidad de la infección. Dosis por tonelada 1.5 - 2 kg.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para una dosificación eficiente.



PRESENTACIONES

Sobres: 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg



NO. REGISTRO

RIP-FAR-361



ESPECIES DE DESTINO



PRECAUCIONES

- No usar en combinación con antiocidantes fonoforos.
- No fumar ni comer, ni beber durante la manipulación del producto.
- Mantener el producto bien cerrado y protegido de la luz.
- Leer la etiqueta antes de administrar el producto.
- No usar en caso de hipersensibilidad a sus componentes.
- No usar en vacas en producción de leche para consumo humano.



ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No arrojar a ríos, canales, ni afluentes de agua.
- Los envases y residuos de producto enterrarlos en lugar seguro.